

くすりのしおり

内服剤

2021年10月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：ベタニス錠 25mg

主成分：ミラベグロン (Mirabegron)

剤形：褐色の錠剤、長径約 12.1mm、短径約 6.1mm、厚さ約 5.2mm

シート記載：（表）ベタニス 25mg、ベタニス、25mg、アステラス製薬、（裏）Betanis 25mg、ベタニス、25mg、過活動膀胱治療剤、社マーク、アステラス製薬



この薬の作用と効果について

膀胱の神経伝達物質の受容体に作用して膀胱を弛緩させることで、尿意切迫感、頻尿および切迫性尿失禁を改善します。

通常、過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿および切迫性尿失禁の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。心疾患がある。肝機能障害がある。
- ・妊娠、妊娠している可能性がある、または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人は1回2錠（主成分として50mg）を1日1回食後に服用しますが、症状により少ない量より飲み始める場合があります。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・割ったり、かみ砕いたりせずに、コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。
- ・飲み忘れた場合、その日は服用せずに、翌日、いつも服用している食後のタイミングで1日分を服用してください。2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、便秘、口内乾燥などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・尿が出ない、尿が出にくい [尿閉]
- ・頭痛、頭重（頭が重い）、めまい [高血圧]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。廃棄については受け取った薬局や医療機関に相談してください。

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。