

## くすりのしおり

内服剤

2014年10月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

### 商品名：アーガメイト 89.29%顆粒 5.6g

主成分：ポリスチレンスルホン酸カルシウム (Calcium polystyrene sulfonate)

剤形：微黄白色～淡黄色の顆粒剤

シート記載：アーガメイト 89.29%顆粒 5.6g、有効成分 5g、1包 5.6g、高カリウム血症改善剤、ARGAMATE 89.29% Gra. 5.6g



### この薬の作用と効果について

腸管内のカリウムイオンを本剤のカルシウムイオンと交換することにより、過剰となったカリウムを体外に排泄します。

通常、腎不全に伴う高カリウム血症の治療に用いられます。

### 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。腸閉塞がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

### 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は<< :医療担当者記入>>
- ・通常、成人は1日 16.80～33.60g（主成分として 15～30g）を2～3回に分け、その1回量を水 30～50mLを用いて服用します。症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は気がついた時点で1回分を服用してください。ただし、次の通常服用する時間が近いときは1回分をとばして次の服用時間に1回分を服用してください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

### 生活上の注意

### この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、便秘、吐き気、食欲不振、胃部不快感、低カリウム血症（脱力感、筋力の低下、四肢の麻痺）などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・激しい腹痛、吐き気、嘔吐 [腸管穿孔]
- ・排便の停止、腹痛、腹部膨満感 [腸閉塞]
- ・腹痛、下痢、下血 [大腸潰瘍]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

### 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

### 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。