

補酵素型ビタミンB2製剤

フラビタンシロップ0.3%

フラビタンアデニンジヌクレオチド シロップ

No.	配合薬剤		フラビタンシロップ 配合量	観察期間	配合変化	備考
	製品名	配合量				
1	アクディームシロップ	50mL	50mL	14日	変化なし	
2	アストミンシロップ	50mL	50mL	14日	変化なし	
3	アスベリンシロップ	5mL	5mL	14日	変化なし	
4	アリメジンシロップ	1mL	1mL	14日	変化なし	
5	イノリンシロップ	1mL	1mL	14日	変化なし	
6	インクレミンシロップ	10mL	5mL	14日	変化なし	
7	ウイントマイロンシロップ	10mL	5mL	14日	変化なし	沈殿するが、振ると容易に分散する。
8	ガスコンドロップ	50mL	50mL	14日	変化なし	
9	ケイツーシロップ	50mL	50mL	14日	変化なし	
10	ザジテンシロップ	50mL	50mL	14日	変化なし	
11	ジゴシンエリキシル	2mL	5mL	14日	変化なし	
12	セネガシロップ	10mL	5mL	14日	変化なし	
13	セルシンシロップ	3mL	5mL	14日	変化なし	
14	デカドロンエリキシル	5mL	5mL	14日	変化なし	
15	デパケンシロップ	50mL	50mL	14日	変化なし	
16	トランサミンシロップ	1mL	1mL	14日	変化なし	
17	トリクロロールシロップ	5mL	5mL	14日	変化なし	
18	ピクシンドライシロップ	2g	5mL	14日	変化なし	沈殿するが、振ると容易に分散する。
19	ピソルボンシロップ	1mL	1mL	14日	変化なし	
20	フェノバルエリキシル	2mL	5mL	14日	変化なし	
21	ブリカニールシロップ	1mL	1mL	14日	変化なし	
22	ブリンペランシロップ	1mL	1mL	14日	変化なし	
23	プロチンシロップ	4mL	15mL	14日		室温で3日後沈殿。4℃、35℃では変化なし。
		5mL	5mL	14日		30℃で本薬が7日後4%、14日後8%分解。
24	ベネトリンシロップ	1mL	1mL	14日	変化なし	
25	ベリアクチンシロップ	1mL	1mL	14日	変化なし	
26	ベロテックシロップ	1mL	1mL	14日	変化なし	
27	ボララミンシロップ	7.5mL	5mL	14日	変化なし	
28	ボンタールシロップ	16mL	6mL	7日	変化なし	
29	ムコソルバン液	2.5mL	2.5mL	7日	変化なし	
30	ムコソルバンシロップ	1mL	1mL	14日	変化なし	
31	ムコダイシロップ	1mL	1mL	14日	変化なし	
32	メジコンシロップ	1mL	1mL	14日	変化なし	
33	メブチンシロップ	1mL	1mL	14日	変化なし	
34	リンデロンシロップ	3mL	5mL	14日	変化なし	
35	レフトーゼシロップ	1mL	1mL	14日		4℃で1日後沈殿、混濁。室温、35℃では変化なし。