

くすりのしおり

注射剤

2019年11月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名:アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」

主成分:アミオダロン塩酸塩 (Amiodarone hydrochloride)

剤形:注射剤

シート記載:



この薬の作用と効果について

心筋のカリウムチャネルなどの抑制作用により、異常な心臓の興奮を鎮めて、脈を正常化させます。通常、心室細動、血行動態不安定な心室頻拍、心停止の治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。洞性徐脈、洞房ブロック、伝導障害、洞不全症候群、循環虚脱、低血圧、甲状腺機能障害またはその既往歴がある。
- ・妊娠している可能性がある、妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（ :医療担当者記入）
- ・通常、静脈内に注射または点滴注射します。
- ・症状を見ながら長期間使用する場合があります。具体的な使用期間については、担当の医師にお聞きください。

生活上の注意

- ・セイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・ワート）を含む健康食品は、薬の代謝を促進して、この薬の作用を弱めるおそれがあるため飲まないでください。すでにこれらの健康食品を飲んでいる場合は医師または薬剤師に相談してください。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、血圧低下、不眠症などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・発熱、から咳、呼吸困難 [間質性肺炎]
- ・全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる [肝炎、肝機能障害、黄疸、肝不全]
- ・めまい、胸が痛い、動悸 [不整脈の悪化、Torsades de pointes、心停止、血圧低下、徐脈、心不全]
- ・発汗、体重減少、動悸 [甲状腺機能亢進症]
- ・発熱、寒気、のどの痛み [無顆粒球症、白血球減少]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。