

# イクスタンジを服用される患者さんへ

監修：宇川 義一 先生（福島県立医科大学 医学部 ヒト神経生理学講座 教授）

## イクスタンジの服用中に けいれん発作がまれに起こることがあります。

### けいれん発作とは

- けいれん発作では、意識障害<sup>い しきしょうがい</sup>や筋肉のこわばり、つっぱりが起こります。
- けいれん発作の起こり方はさまざまです。
  - ・ 意識障害<sup>い しきしょうがい</sup>では、気を失う場合もあります。
  - ・ 筋肉のこわばりやつっぱりは、全身に起こる場合と、手、足、顔面などに部分的に起こる場合があります。
- 通常、けいれん発作は数分以内に治まります。

### 以下にあてはまる方は、服用前に主治医にご相談ください

- てんかんや、けいれん発作を起こしたことのある方
- 脳損傷<sup>のう ぞんしょう</sup>、脳卒中<sup>のう そっちゅう</sup>などを起こしている、または起こしたことがある方
- イクスタンジ以外に服用している薬剤がある方

### けいれん発作が起きたときには

- 顔を横に向け、安静にして、けいれん発作が治まるのを待ちましょう。
- けいれん発作が治まらない時は、すみやかに病院を受診しましょう。
- けいれん発作が起きたことは、必ず主治医に伝えましょう。

### イクスタンジを服用する前に

- ご家族の方などに、けいれん発作が起こる可能性があることを伝えておきましょう。
- 自動車の運転など危険を伴う機械の操作には注意しましょう。

気になる症状があらわれたら、主治医にご相談ください。