

# くすりのしおり

内服剤

2020年09月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 商品名：リンゼス錠 0.25mg

主成分：リナクロチド(Linaclotide)

剤形：淡黄色の錠剤、直径約 6.6mm、厚さ約 3.1mm

シート記載：（表）リンゼス 0.25mg、本剤は吸湿するため、服用直前に取り出してください。社マーク+725、（裏）Linzess 0.25mg、リンゼス 0.25mg、注意 服用直前に取り出す、社マーク、アステラス製薬



## この薬の作用と効果について

腸管上皮の表面に存在するグアニル酸シクラーゼC受容体に作用し、腸管内への水分分泌を促進することにより、排便を促進します。また、大腸の痛覚過敏を改善することにより、腹痛・腹部不快感を改善します。通常、便秘型過敏性腸症候群、または慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く）の治療に用いられます。

## 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。機械的消化管閉塞またはその疑いがある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人は1回2錠（主成分として0.5mg）を1日1回、食前に服用します。症状により1回1錠（0.25mg）に減量されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・飲み忘れた場合は、その日は飲まないで、次の日からいつも服用している食前のタイミングで1日分を服用してください。決して2回分を一度に飲まないでください。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

## 生活上の注意

### この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、下痢などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・泥状または水様の便、激しい腹痛 [重度の下痢]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

### 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・吸湿性があるので、飲む直前にシートから錠剤を取り出してください。また、シートから取り出した錠剤を、無包装状態あるいは別容器で保存しないでください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

### 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。