

# くすりのしおり

内服剤

2020年11月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

## 商品名：レグナイト錠 300mg

主成分：ガバペンチン エナカルビル(Gabapentin enacarbil)

剤形：白色の錠剤、長径 15.1mm、短径 8.0mm、厚さ 5.7mm

シート記載：（表）300mg、レグナイト、社マーク+731、1日1回夕食後、社マーク、アステラス製薬、Regnite、レストレスレッグス症候群治療剤、（裏）なし



## この薬の作用と効果について

カルシウムチャネルの  $\alpha_2\delta$  サブユニットに結合して、安静時に脚などに生じる異常感覚などの伝わりを抑えることで、特発性レストレスレッグス症候群の症状を改善します。

通常、中等度から高度の特発性レストレスレッグス症候群（下肢静止不能症候群）の治療に用いられます。

## 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。腎機能障害がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

## 用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人は1回2錠（主成分として600mg）を1日1回夕食後に服用します。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・主成分が徐々に溶けだすよう工夫された薬です。医師または薬剤師の指示を守って服用してください。
- ・割ったり、砕いたり、すりつぶしたりしないで、そのままかまわずに服用してください。
- ・飲み忘れた場合はその日は服用せずに翌日の服用時間（夕食後）に1回分を服用してください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

## 生活上の注意

- ・体重増加を来すことがありますので、肥満の徴候があらわれた場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・眠気、注意力・集中力・反射運動能力などの低下があらわれることがありますので、自動車の運転や危険を伴う機械の操作は避けてください。
- ・霧視（目のかすみ）、目の調節障害（目のピントが合いにくい）があらわれることがありますので、症状に気づいたら医師または薬剤師に相談してください。
- ・アルコール飲料は、この薬の徐放性に影響をあたえますので避けてください。

## この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、眠気、浮動性めまいなどが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・尿量が減る、むくみ、全身倦怠感 [急性腎障害]
- ・発熱、食欲不振、全身倦怠感 [皮膚粘膜眼症候群]
- ・発疹、発熱 [薬剤性過敏症候群]
- ・吐き気・嘔吐、全身倦怠感、皮膚や白目が黄色くなる [肝炎、肝機能障害、黄疸]
- ・筋肉痛、脱力感、赤褐色尿 [横紋筋融解症]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

## 保管方法 その他

- ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・薬の入ったシートは、アルミ袋包装開封後は専用の保管袋で保存してください。
- ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

## 医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイ

ド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。