

患者携帯カード

## パドセブ®による治療を受けている 患者さんへ

副作用の重症化を防ぐための注意点

- このカードを財布などに入れて携帯してください。
- 症状には個人差がありますので、カードに記載されている症状以外にも、気になる症状があらわれた場合は、すぐに医師、看護師、薬剤師に相談してください。

### 高血糖

- のどが渇く
- 多飲（お水をたくさん飲む）
- 多尿（トイレの回数が増える）
- 体重減少
- 疲れやすい など

### 手足の神経の障害

- 手や足がピリピリとしびれる
- 手や足がジンジンと痛む
- 手や足の感覚がなくなる
- 手や足に力が入らない
- 物がつかみづらい など

医療機関名：

電話番号：

アステラス製薬株式会社

(2023年1月作成) EMC-NK  
PEV22003A01

皮膚が赤くなるなどの症状が、全身や広い範囲にあらわれたら、すぐに医師または治療を受けている医療機関に連絡しましょう。



### 皮膚の症状

- 赤み
- 水ぶくれ
- かさつき
- ブツブツ
- かゆみ
- 痛み など



### ！ 注意

皮膚の症状に加えて、発熱や粘膜（口や目）の異常など、下記の関連する症状があらわれたら、すぐに医師または治療を受けている医療機関に連絡しましょう。

- 高熱（38℃以上）
- 目の充血（目が赤い）
- めやに
- まぶたの腫れ
- 目が開けづらい
- くちびるや陰部のただれ
- 排尿 / 排便時の痛み
- のどの痛み
- 皮膚の広い範囲が赤くなる など