

くすりのしおり

注射剤

2023年08月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

製品名：ファンガード点滴用 50mg

主成分：ミカファンギンナトリウム (Micafungin sodium)

剤形：注射剤

シート記載など：



この薬の作用と効果について

カンディン系の抗真菌剤で、真菌（カビの一種）の細胞壁の合成を妨げることにより、真菌の増殖を抑え、抗真菌作用を示します。

通常、アスペルギルス属およびカンジダ属による真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症の治療、造血幹細胞移植患者におけるアスペルギルス症およびカンジダ症の予防に用いられます。

次のような方は注意が必要な場合があります。必ず担当の医師や薬剤師に伝えてください。

- ・以前に薬や食べ物で、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。肝機能障害がある。
- ・妊娠または授乳中
- ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・あなたの用法・用量は（：医療担当者記入）
- ・通常、成人および小児は1日1回、点滴で静脈内に注射します。
具体的な使用期間については、担当の医師にお聞きください。

生活上の注意

- ・白血球減少、好中球減少、溶血性貧血、血小板減少があらわれることがあるので、定期的に検査が行われます。
- ・肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので、定期的に肝機能検査が行われます。
- ・急性腎障害などの重篤な腎障害があらわれることがあるので、定期的に検査が行われます。

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、発疹、高血圧、動悸、下痢、軟便、静脈炎（局所の疼痛・腫れ）、関節炎、血管痛、寒気、頭痛などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・のどの痛み、貧血症状、出血傾向 [血液障害]
- ・血圧低下、口内異常感、呼吸困難 [ショック、アナフィラキシー]
- ・全身倦怠感、食欲不振、吐き気・嘔吐、皮膚や白目が黄色くなる [肝機能障害、黄疸]
- ・尿量が減る、むくみ、全身倦怠感 [急性腎障害]
- ・発熱、皮膚・粘膜が赤く腫れて発疹や水ぶくれができる、眼球結膜の充血 [中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法 その他

医療担当者記入欄

年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療関係者向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。