

パドセブ[®] 点滴静注用 20mg/30mg 調製に必要なバイアル本数※及び廃液量 (参考)

薬価	
20mg	61,276円
30mg	91,444円



2024年4月現在

投与量	患者の体重 (kg)	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	≥100	
通常投与量注： 1.25mg/kg (最大 125mg)	パドセブ必要量 (mL)	5.0	5.6	6.3	6.9	7.5	8.1	8.8	9.4	10.0	10.6	11.3	11.9	12.5	
	20mg・30mg 両剤使用	20mg (本数)	1	0	2	2	1	0	0	2	2	1	0	0	2
		30mg (本数)	1	2	1	1	2	3	3	2	2	3	4	4	3
		廃液量 (mL)	0	0.4	0.7	0.1	0.5	0.9	0.2	0.6	0	0.4	0.7	0.1	0.5
	薬価 (円)	152,720	182,888	213,996	213,996	244,164	274,332	274,332	305,440	305,440	335,608	365,776	365,776	396,884	
	20mg 単剤使用	20mg (本数)	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7
		廃液量 (mL)	1	0.4	1.7	1.1	0.5	1.9	1.2	0.6	0	1.4	0.7	0.1	1.5
		薬価 (円)	183,828	183,828	245,104	245,104	245,104	306,380	306,380	306,380	306,380	367,656	367,656	367,656	428,932
	30mg 単剤使用	30mg (本数)	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5
		廃液量 (mL)	1	0.4	2.7	2.1	1.5	0.9	0.2	2.6	2	1.4	0.7	0.1	2.5
		薬価 (円)	182,888	182,888	274,332	274,332	274,332	274,332	274,332	365,776	365,776	365,776	365,776	365,776	457,220
	1段階減量注： 1.0mg/kg (最大 100mg)	パドセブ必要量 (mL)	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
20mg・30mg 両剤使用		20mg (本数)	2	1	1	0	0	2	2	1	1	0	0	2	2
		30mg (本数)	0	1	1	2	2	1	1	2	2	3	3	2	2
		廃液量 (mL)	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0
薬価 (円)		122,552	152,720	152,720	182,888	182,888	213,996	213,996	244,164	244,164	274,332	274,332	305,440	305,440	
20mg 単剤使用		20mg (本数)	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
		廃液量 (mL)	0	1.5	1	0.5	0	1.5	1	0.5	0	1.5	1	0.5	0
		薬価 (円)	122,552	183,828	183,828	183,828	183,828	245,104	245,104	245,104	245,104	306,380	306,380	306,380	306,380
30mg 単剤使用		30mg (本数)	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4
		廃液量 (mL)	2	1.5	1	0.5	0	2.5	2	1.5	1	0.5	0	2.5	2
		薬価 (円)	182,888	182,888	182,888	182,888	182,888	274,332	274,332	274,332	274,332	274,332	274,332	365,776	365,776

●希釈後の濃度は0.3～4.0mg/mLでなければならない。

※20mg製剤からは2mL、30mg製剤からは3mLを抜き取ることを前提に算出。

注：副作用の発現により減量する場合は、減量の目安を考慮して算出する。詳細は、最新の電子化された添付文書7. 用法及び用量に関連する注意を確認すること。

パドセブ[®] 点滴静注用 20mg/30mg 調製に必要なバイアル本数※及び廃液量 (参考)

薬価	
20mg	61,276円
30mg	91,444円



2024年4月現在

投与量	患者の体重 (kg)	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	≥100	
2段階減量注: 0.75mg/kg (最大 75mg)	パドセブ必要量 (mL)	3.0	3.4	3.8	4.1	4.5	4.9	5.3	5.6	6.0	6.4	6.8	7.1	7.5	
	20mg・30mg 両剤使用	20mg (本数)	0	2	2	1	1	1	0	0	0	2	2	1	1
		30mg (本数)	1	0	0	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2
		廃液量 (mL)	0	0.6	0.2	0.9	0.5	0.1	0.7	0.4	0	0.6	0.2	0.9	0.5
	薬価 (円)	91,444	122,552	122,552	152,720	152,720	152,720	182,888	182,888	182,888	213,996	213,996	244,164	244,164	
	20mg 単剤使用	20mg (本数)	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
		廃液量 (mL)	1	0.6	0.2	1.9	1.5	1.1	0.7	0.4	0	1.6	1.2	0.9	0.5
		薬価 (円)	122,552	122,552	122,552	183,828	183,828	183,828	183,828	183,828	183,828	245,104	245,104	245,104	245,104
	30mg 単剤使用	30mg (本数)	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
		廃液量 (mL)	0	2.6	2.2	1.9	1.5	1.1	0.7	0.4	0	2.6	2.2	1.9	1.5
		薬価 (円)	91,444	182,888	182,888	182,888	182,888	182,888	182,888	182,888	182,888	274,332	274,332	274,332	274,332
	3段階減量注: 0.5mg/kg (最大 50mg)	パドセブ必要量 (mL)	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.3	3.5	3.8	4.0	4.3	4.5	4.8	5.0
20mg・30mg 両剤使用		20mg (本数)	1	0	0	0	0	2	2	2	2	1	1	1	1
		30mg (本数)	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
		廃液量 (mL)	0	0.7	0.5	0.2	0	0.7	0.5	0.2	0	0.7	0.5	0.2	0
薬価 (円)		61,276	91,444	91,444	91,444	91,444	122,552	122,552	122,552	122,552	122,552	152,720	152,720	152,720	152,720
20mg 単剤使用		20mg (本数)	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
		廃液量 (mL)	0	1.7	1.5	1.2	1	0.7	0.5	0.2	0	1.7	1.5	1.2	1
		薬価 (円)	61,276	122,552	122,552	122,552	122,552	122,552	122,552	122,552	122,552	183,828	183,828	183,828	183,828
30mg 単剤使用		30mg (本数)	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
		廃液量 (mL)	1	0.7	0.5	0.2	0	2.7	2.5	2.2	2	1.7	1.5	1.2	1
		薬価 (円)	91,444	91,444	91,444	91,444	91,444	182,888	182,888	182,888	182,888	182,888	182,888	182,888	182,888

●希釈後の濃度は 0.3 ~ 4.0mg/mL でなければならない。

※20mg 製剤からは2mL、30mg 製剤からは3mL を抜き取ることを前提に算出。

注：副作用の発現により減量する場合は、減量の目安を考慮して算出する。詳細は、最新の電子化された添付文書7. 用法及び用量に関連する注意を確認すること。

