

グラセプターをこれから服用される患者さん
グラセプターを服用されている患者さんへ

飲んだかどうか
不安に
なってしまう

うっかり
飲み忘れて
しまう



服薬の悩みを
一緒に解決しましょう

服薬で悩んでいませんか？

お薬の数も種類も多くて…


お薬によって飲む時間が
バラバラなので…

外食したらついうっかり…



飲んだかどうか不安で
目が覚めてしまう…

気がつくとお薬が余ってる…



服薬の重要性




移植後は移植臓器を
拒絶反応から守るために、
免疫抑制剤をきちんと忘れずに
飲むことが大切です。
合併症の治療も、
移植臓器を長持ちさせるために
必要です。

免疫抑制剤は、指示どおりに服薬することが大切です。

免疫抑制剤の飲み忘れは、
拒絶反応の増加につながる恐れがあります。


免疫抑制剤の飲み忘れと拒絶反応発現率の関係 (海外データ)



Vlaminck H, et al: Am J Transplant 4 (9) : 1509-1513, 2004

免疫抑制剤の飲み忘れは、
移植臓器の生着率の低下につながる恐れがあります。

免疫抑制剤の飲み忘れと移植腎生着率の関係 (海外データ)





Michelon TF, et al: Transplant Proc 34 (7) : 2768-2770, 2002

移植患者さんも、生活習慣病を管理することは大切です。



血圧が高いと心筋梗塞や脳卒中などの危険性が高まることはよく知られていますが、移植臓器の寿命が縮まる（生着率が低下する）ことも報告されています。

血圧と移植腎生着率の関係（海外データ）



医師、薬剤師、看護師、コーディネーターに
ご相談ください。

飲み忘れしにくい時間帯に
服薬できるお薬にする。

飲む回数の少ないお薬にする。

2種類以上のお薬が
1つになったお薬にする。




あなたのライフスタイルに合った
服薬スケジュールを
一緒につくりましょう。




徐放性製剤とは

長く作用できるように工夫されたお薬です。
お薬を飲む回数を減らすことができます。



配合剤とは

複数のお薬が1つにまとまっているお薬です。
飲むお薬の数を減らすことができます。



**徐放性製剤や配合剤は、
お薬の飲み忘れや服薬の手間を
減らすための有効な方法の1つです。**

緊急時連絡先

病・医院名